



Veilige en doeltreffende nagelmycose behandeling
Traitement sûr et efficace contre la mycose des ongles
Sichere und wirksame Nagelpilz-Behandlung

NL

LEES DE VOLLEDIGE BIJSLUITER VOORDAT U MYCOSAN® GEBRUIKT

Mycosan kit bevat:

1. Een handige stift met geïntegreerde kwast die een gepatenteerd nagelserum bevat (*Bestanddelen – water, rogge fermentatiefiltraat, pentyleenglycol, dimethylisosorbide, hydroxyethylcellulose*).

2. 10 nagelvijlen voor eenmalig gebruik – een ruw vlak op de ene zijde en een glad vlak op de andere zijde.

3. Deze bijsluiter, die gedetailleerde informatie bevat over nagelmycosen, het product, enkele tips & trucs en een persoonlijk Mycosan behandelingschema voor een doeltreffende behandeling.

Wat is een nagelmycose?

Een nagelmycose is een schimmel die de nagel aantast en zijn geleidelijke vernietiging veroorzaakt. Kenmerkend is dat het uitzicht van de nagel verandert: de nagelplaat wordt dikker, verkleurt geel en begint los te komen van het nagelbed. Pijn kan optreden, vooral tijdens het stappen. Zonder behandeling zal de aandoening waarschijnlijk vergeren en zich uitbreiden naar andere nagels of zelfs andere personen besmetten.

Wat kan een nagelmycose veroorzaken?

Vele factoren bevorderen het optreden van een nagelmycose: microtraumata, het dragen van synthetische kousen, nauwe schoenen, bepaalde sporten zoals zwemmen, wandelen of marathonlopen... en, in het algemeen, alle situaties waarin de voeten gevoelig zijn voor zweten, maceratie, vochtigheid en herhaalde schokken. Een nagelmycose ontwikkelt zich als gevolg van een schimmelbesmetting van de nagel (dermatofyten, Candida) na een vroegere huidinfectie, zoals bijvoorbeeld voetschimmel. Als ze slecht behandeld worden of volledig onbehandeld blijven, kunnen schimmelinfecties van de huid zich uitbreiden en een nagelmycose veroorzaken. Belangrijk om te vermelden is dat sommige personen gevoeliger zijn voor schimmelinfecties: diabetici, mensen die problemen met de bloedsomloop hebben, mensen die een beroep hebben waarvoor ze veiligheidsschoenen of -laarzen moeten dragen, enz. Als het probleem blijft bestaan, raadpleeg uw arts.

Indicaties

Mycosan is een eerstelijnsbehandeling van lichte/bepaalde vormen van nagelmycose. Het gepatenteerde serum heeft zijn werkzaamheid bewezen:

- Zijn gerichte werking stopt snel de ontwikkeling van de schimmel die verantwoordelijk is voor de nagelmycose,
- Het penetreert in de nagel en stabiliseert zijn structuur voor een gezonde hergroei: de nagel is hersteld en beschermd,
- De vorming van een beschermende barrière voorkomt dat de schimmel zich verspreidt naar andere gebieden. Mycosan is actief vanaf de eerste toepassing. De stift is gemakkelijk in gebruik voor een snelle en doeltreffende behandeling van de nagelmycose. Het product dat kleurloos en geurloos is, droogt in minder dan twee minuten.

Dosering

Geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar. Voor gebruik, de nagels reinigen en drogen, en zorgvuldig alle resten van nagellak verwijderen.

- Behandeling

Breng Mycosan tweemaal per dag aan op de aangetaste nagel gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 4 weken. Laat 2 minuten drogen. Daarna, breng eenmaal per dag aan tot de nagel zijn normaal uiterlijk volledig terug heeft gevonden.

- Preventie van besmetting

Breng Mycosan eenmaal per dag aan op gezonde nagels in de buurt van de zone die met de schimmel is aangetast. **[FIG 01]**

- Commentaar

- Het gebruik van een gekleurde nagellak als tweede laag is niet gecontraïndiceerd. Om doeltreffend te zijn, moet Mycosan echter rechtstreeks op de nagel aangebracht worden: de gekleurde nagellak moet bijgevolg verwijderd worden voor het aanbrengen van Mycosan.
- Door het oppervlak van de aangetaste nagel eenmaal per week zorgvuldig te vijlen, wordt de aangetaste zone gekroedeerd. Vermijd om dezelfde vijl op gezonde nagels te gebruiken omwille van het risico op besmetting. Aarzel niet om uw arts of apotheker om advies te vragen.

FIG.01

1. Vijlen/
Limer/
Feilen

2. Aanbrengen/
Appliquer/
Auftragen

3. Drogen/
Sécher/
Trocknen

FIG.02

Nagel sjablonen om de voortgang van de behandeling bij te houden

Modèles d'ongle pour surveiller les progrès du traitement

Nagel-Dokumentvorlagen, um den Fortschritt der Behandlung zu messen

Start behandeling
Début du traitement
Beginn der Behandlung

maand
mois
Monat

maanden
mois
Monate

maanden
mois
Monate

De doeltreffendheid van uw behandeling controleren

Om de doeltreffendheid van Mycosan te controleren, duid elke maand het gebied aan dat aangetast is door de schimmel. De volgende diagrammen zullen u helpen om de bereikte voortgang te meten: **[FIG 02 – nagel sjablonen]**

Behandelingschema van Mycosan

- Voor een succesvolle behandeling, volg de richtlijnen zoals vermeld in deze bijsluiter.
- Gebruik het schema om uw behandeling op te volgen.

Breng Mycosan tweemaal per dag aan en vijl de aangetaste nagel eenmaal per week.

- Hoewel het mogelijk is dat u geen verbetering ziet tijdens de eerste 1 of 2 maanden, betekent dit niet dat de behandeling niet werkt. Menselijke nagels groeien traag en het kan 6 tot 9 maanden duren voordat de aangepaste zone volledig is uitgegroeid. Behandel de nagel(s) regelmatig en houd de voortgang bij met de nagel sjablonen! **[FIG 03 – behandelingschema]**

Belangrijke tips om de doeltreffendheid van Mycosan te optimaliseren

- Droog uw handen en voeten na het wassen altijd goed af met een droge handdoek die alleen voor u bestemd is.
- Beveest bij zware aandoening aan de nimmis tussen vingers en tenen.
- Knip uw nagels kort en vermijd om te bijten aan uw nagels of velletjes aan de nagelriemen af te trekken, wat de nagels waarschijnlijk zal verzwakken en blootstellen aan microtraumata.
- Geef de voorkeur aan katoenen kousen om uw voeten fris en droog te houden. Verander ze regelmatig als u hevig zweet.
- Vermijd schoenen die van synthetische materialen gemaakt zijn.
- Kies geschikte schoenen die niet te nauw of te aansluitend zijn, zodat uw voeten kunnen ademen.
- Draag altijd slippers in zwembaden en kleedkamers om niet in contact te komen met schimmels die zich vernieuwvuldigen in vochtige milieus.
- Behandel voetschimmels systematisch aangezien ze zich kunnen uitbreiden naar de teenagels. Bij dit type schimmel wordt het ook aanbevolen om kousen en schoenen met een schimmelbestrijdend middel te behandelen.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan een allergische reactie op één van de bestanddelen optreden (contactdermatitis). Stop onmiddellijk de behandeling als u tekens van irritatie of een uitbraak ziet. Als het probleem blijft bestaan, raadpleeg uw arts.

Waarschuwingen voor uitwendig gebruik

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Mycosan mag niet gebruikt worden in geval van bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Gebruik het product alleen voor uzelf.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij kamertemperatuur. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruiken voor de vervaldatum die vermeld staat op de onderkant van de tube. De tube zorgvuldig sluiten na gebruik.

Voor meer informatie, raadpleeg www.mycosan.com

Laatste aanpassing: 05/11/2014

Verdeeld door:

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk

Fabrikant: Serrix B.V.,
Herengracht 458,
1017 CA Amsterdam,
Nederland

Info@mycosan.com

MO14BE101

FR

VEUILLEZ LIRE L'INTEGRALITE DE CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER MYCOSAN®

Le kit Mycosan contient

1. Un stylet applicateur facile à utiliser contenant un sérum breveté pour les ongles (*Ingrédients – Eau, filtrat de ferment de seigle, pentylène glycol, isosorbide de diméthyle, hydroxyéthylcellulose*).
2. 10 limes à ongles à usage unique avec une surface rugueuse et une surface lisse.
3. Cette notice, qui fournit des informations détaillées concernant la mycose des ongles, le produit, quelques trucs et astuces ainsi qu'un calendrier personnel Mycosan favorisant un traitement efficace.

Qu'est-ce qu'une mycose des ongles?

Il s'agit d'une infection de l'ongle provoquée par un champignon qui se loge dans l'ongle et le détruit progressivement. Elle se caractérise par une altération de l'aspect de l'ongle : l'ongle jaunit, s'épaissit et/ou se décolle. Des douleurs, notamment lors de la marche, peuvent se faire sentir. Sans traitement, la situation risque de s'aggraver et l'infection peut s'étendre à d'autres ongles, voire contaminer d'autres personnes.

Qu'est-ce qui provoque une mycose des ongles?

De nombreux facteurs favorisent l'apparition des mycoses des ongles: des micro-traumatismes, le port de chaussettes en tissu synthétique ou de chaussures étroites, la pratique de certains sports tels que la natation, la randonnée ou le marathon... et de manière générale, toutes les situations favorisant la transpiration, la macération du pied, l'humidité et les chocs répétés. La mycose des ongles provient de la contamination de l'ongle par des champignons (dermatophytes, Candida) ayant infecté la peau au préalable, comme par exemple la mycose des ongles (appelée pied d'athlète ou intertrigo des orteils). En effet, non ou mal soignée, elle peut se propager et provoquer une mycose des ongles.

FIG.03

Start datum behandeling: _____

Date de début du traitement : _____

Datum des Beginns der Behandlung: _____

week Semaine Woche	Maandag Lundi Montag	Dinsdag Mardi Dienstag	Woensdag Mercredi Mittwoch	Donderdag Jeudi Donnerstag	Vrijdag Vendredi Freitag	Zaterdag Samedi Samstag	Zondag Dimanche Sonntag	Vijlen Limer Feilen	
1	1	2	1	2	1	2	1	2	0
2	1	2	1	2	1	2	1	2	0
3	1	2	1	2	1	2	1	2	0
4	1	2	1	2	1	2	1	2	0
5	1		1		1		1		0
6	1		1		1		1		0
7	1		1		1		1		0
8	1		1		1		1		0
9	1		1		1		1		0
10	1		1		1		1		0
...									

NB. Doorstreep (x) in het schema, telkens als u uw nagel behandeld hebt (aanbrengen en/of vijlen).

NB. Tracez une croix (x) dans le schéma chaque fois que vous avez traité votre ongle (application et/ou image).

N.B. Kreuzen Sie (x) im Zeitplan jedes Mal an, wenn Sie Ihren Nagel behandelt haben (Auftragen und/oder Feilen).

Il est à noter que certaines personnes sont plus sujettes aux mycoses : les individus diabétiques, souffrant de troubles circulatoires ou exerçant une profession nécessitant le port de chaussures de sécurité, de bottes, etc. Si le problème persiste, consultez votre médecin.

Indications

Mycosan est destiné au traitement des mycoses des ongles peu étendues. L'efficacité du sérum bioactif breveté a été prouvée cliniquement:

- son action ciblée stoppe rapidement la progression du champignon responsable de la mycose des ongles ;
- il pénètre dans l'ongle et stabilise sa structure pour une repousse saine : l'ongle est régénéré et protégé ;
- la création d'une barrière protectrice évite la propagation des mycoses vers d'autres zones.

Mycosan agit dès la première application. Le stylo applicateur permet de traiter la mycose d'un geste rapide et efficace. Incolore et inodore, le produit sèche en moins de deux minutes.

Posologie

Adultes et enfants à partir de 4 ans. Avant l'utilisation, nettoyez et séchez les ongles en enlevant soigneusement toute trace de vernis à ongles.

- Traitement

Appliquez Mycosan sur l'ongle atteint deux fois par jour, pendant au moins 4 semaines sans interruption. Laissez sécher pendant 2 minutes. Ensuite, afin de maximiser l'efficacité du traitement, continuez à appliquer le sérum une fois par jour jusqu'à ce que l'ongle ait retrouvé son aspect normal.

- Prévention contre la contamination

Appliquez Mycosan une fois par jour sur les ongles sains limitrophes à la zone atteinte par la mycose pour éviter toute propagation. **[FIG 01]**

- Commentaires

- L'application d'une couche de vernis à ongles coloré n'est pas contre-indiquée. Néanmoins, afin d'être efficace, Mycosan doit être appliqué directement sur l'ongle : le vernis à ongles coloré doit donc être retiré avant l'application de Mycosan.
- Chaque semaine, limez soigneusement la surface de l'ongle atteint afin d'éroder la zone affectée. Évitez d'utiliser la même lime sur les ongles sains, au risque de les contaminer. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Contrôlez l'efficacité de votre traitement

Afin de contrôler l'efficacité de Mycosan, évaluez chaque mois la zone affectée à l'aide d'un diagramme. Les schémas suivants vous permettront de mesurer les progrès réalisés. **[FIG 02 – modèle d'ongle]**

Schéma du traitement par Mycosan

- Pour favoriser la réussite du traitement, suivez les instructions de la présente notice.
- Utilisez le schéma pour surveiller votre traitement.

Appliquez Mycosan deux fois par jour et limez l'ongle affecté une fois par semaine.

- Au cas où vous ne remarquez aucune amélioration au cours des deux premiers mois, cela ne signifie pas que le traitement n'agit pas. Les ongles humains poussent lentement et la repousse d'un ongle sain peut durer 6 à 9 mois. Traitez régulièrement l'ongle (les ongles) et surveillez les progrès du traitement à l'aide des modèles d'ongle ! **[FIG 03 – schéma du traitement]**

Recommandations importantes pour optimiser l'efficacité de Mycosan

- Sécher systématiquement les mains et les pieds après chaque lavage, particulièrement entre les doigts et les orteils, à l'aide d'une serviette propre destinée à votre usage personnel.
- Couper les ongles courts et éviter de les ronger ou de retirer leur cuticule, au risque de les fragiliser ou de les exposer à des micro-traumatismes.
- Privilégier les chaussettes en coton afin de garder les pieds frais et secs. Les changer régulièrement en cas de forte transpiration.
- Éviter les chaussures en matière synthétique.
- Choisir des chaussures adéquates, ni trop étroites ni trop fermées, afin de permettre aux pieds de respirer.
- Toujours porter des sandales dans les piscines et les cabines, afin d'éviter tout contact avec les champignons qui prolifèrent dans les milieux humides.
- Traiter systématiquement les mycoses des pieds (pied d'athlète) car elles peuvent se propager aux ongles des orteils. Pour ce type de mycose, il est également recommandé de traiter les chaussettes et les chaussures avec un produit antifongique.

Effets indésirables

Dans de rares cas, une réaction allergique à l'un des ingrédients peut survenir (dermatite de contact). Arrêtez immédiatement le traitement si des irritations ou des éruptions apparaissent. Si le problème persiste, consultez votre médecin.

Mises en garde en cas d'usage externe

N'utilisez pas Mycosan chez les enfants de moins de 4 ans. N'appliquez pas Mycosan en cas d'hypersensibilité connue à l'un des ingrédients. Privilégiez une utilisation individuelle du produit.

Conditions de conservation

A conserver à température ambiante. Tenir hors de la portée des enfants. À utiliser avant la date de péremption imprimée sur le tube. Fermer soigneusement le tube après l'utilisation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mycosan.com

Dernière mise à jour : 05/11/2014

Distribué par :

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk

Fabrikant: Serrix B.V.,
Herengracht 458,
1017 CA Amsterdam,
Pays-Bas

Info@mycosan.com

MO14BE101

DE

LESEN SIE DIE GESAMTE PACKUNGSBEILAGE DURCH, BEVOR SIE MYCOSAN® ANWENDEN

Mycosan Kit enthält:

1. einen einfach anzuwendenden Pinselapplikator mit patentiertem Nagelserum (Bestandteile - Wasser, Roggenfermentationsfiltrat, Pentylenglykol, Dimethylisosorbid, Hydroxyethylcellulose).
2. 10 Einwegfeilen – eine raue Fläche auf der einen Seite und eine weiche Fläche auf der anderen Seite.
3. diese Packungsbeilage, mit detaillierten Informationen über Nagelpilz, das Produkt, ein paar Tipps und Tricks und ein persönliches Mycosan-Tagebuch für eine wirksame Behandlung.

Was ist Nagelpilz?

Nagelpilz ist ein Pilz, der im Nagel auftritt und ihn schrittweise zerstört. Er wird durch eine Veränderung des Aussehens des Nagels, eine Verdickung und eine gelbe Verfärbung der Nagelplatte und ein Ablösen des Nagelbettes gekennzeichnet. Schmerzen, insbesondere beim Gehen, können auftreten. Ohne Behandlung kann sich die Krankheit verschlimmern, zu anderen Nägeln übertragen werden und sogar andere Personen anstecken.

Was kann Nagelpilz hervorrufen?

Mehrere Faktoren begünstigen das Auftreten von Nagelpilz: Mikrotraumata, das Tragen von synthetischen Socken, enge Schuhe, bestimmte Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen, Wandern, Marathonlauf... und generell, alle Situationen, in denen die Füße zum Schwitzen, zur Mazeration, zur Feuchtigkeit und zu wiederholtem Schock neigen. Nagelpilz resultiert aus Pilzinfektion des Nagels (Dermatophyten, Candida) nach vorheriger Infektion der Haut, wie zum Beispiel Fußpilz. Wenn sie schlecht behandelt werden oder unbehandelt bleiben, können sich Pilzinfektionen der Haut tatsächlich ausbreiten und Nagelpilz hervorrufen. Es ist anzumerken, dass bestimmte Personen für Pilzinfektionen anfälliger sind: Diabetiker; Personen, die an Kreislaufstörungen leiden; Personen, die Aktivitäten ausüben, die das Tragen von Sicherheitsschuhen oder Stiefeln erfordern, etc. Sollte das Problem andauern, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.

Anwendung

Mycosan wird empfohlen bei erstmaliger Behandlung von begrenztem/leichtem Nagelpilz (Mycose). Das patentierte Serum hat seine Wirksamkeit nachgewiesen:

- seine gezielte Wirkung hemmt schnell die Entwicklung des Pilzes, der für den Nagelpilz verantwortlich ist,
- es zieht in den Nagel ein und stabilisiert dessen Struktur für ein gesundes Nachwachsen: der Nagel ist regeneriert und geschützt,
- durch das Schaffen einer Schutzbarriere wird die Vermehrung des Pilzes auf andere Regionen vermieden.

Mycosan wirkt bereits ab der ersten Anwendung. Der leicht zu benutzende Stift ermöglicht eine schnelle und wirksame Behandlung des Nagelpilzes. Das farb- und geruchlose Produkt trocknet in weniger als zwei Minuten.

Dosierung

Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren. Vor der Anwendung die Nägel reinigen und trocknen, sowie alle Spuren von Nagellack entfernen.

- Behandlung

Tragen Sie Mycosan zweimal pro Tag auf die geschädigten Nägel auf. Die Behandlung muss mindestens 4 Wochen ununterbrochen durchgeführt werden. Lassen Sie das Produkt 2 Minuten trocknen. Tragen Sie nach 4 Wochen das Produkt nur noch einmal pro Tag auf, bis der Nagel sein übliches Aussehen wieder vollständig erlangt hat.

- Vorbeugung gegen Ansteckung

Tragen Sie Mycosan einmal pro Tag auf die gesunden Nägel in der Nähe der pilzbefallenen Stelle auf. **[ABB. 01]**

- Anmerkungen

- Die Anwendung eines farbigen Nagellacks als zweite Schicht ist möglich. Um seine Wirksamkeit zu entfalten, muss Mycosan jedoch direkt auf den Nagel aufgetragen werden: der farbige Nagellack muss also vor dem Auftragen von Mycosan entfernt werden.
- Feilen Sie einmal pro Woche die Fläche des betroffenen Nagels vorsichtig ab um den geschädigten Bereich des Nagels zu entfernen. Vermeiden Sie die Anwendung derselben Feile auf den gesunden Nägeln, um das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Kontrolle der Wirksamkeit Ihrer Behandlung

Überprüfen Sie die von dem Pilz betroffene Stelle jeden Monat, um die Wirksamkeit von Mycosan zu kontrollieren. Diese Diagramme werden Ihnen dabei helfen, den erfolgten Fortschritt zu messen. **[ABB. 02 – Nagel-Dokumentvorlage]**

Mycosan Behandlungszeitplan

- Für die erfolgreiche Behandlung befolgen Sie die Anweisungen dieser Packungsbeilage.
- Richten Sie sich für Ihre Behandlung nach dem vorgegebenen Zeitplan.
- Tragen Sie Mycosan zweimal pro Tag auf und teilen Sie den betroffenen Nagel einmal pro Woche.
- Selbst wenn eine Besserung im ersten oder im zweiten Monat nicht sichtbar ist, bedeutet dies nicht, dass die Behandlung nicht wirkt. Menschliche Nägel wachsen langsam und es kann 6 bis 9 Monate dauern, bevor die betroffene Stelle völlig ausgewachsen ist. Behandeln Sie den Nagel/die Nägel regelmäßig und kontrollieren Sie den Fortschritt mit den Nagel-Dokumentvorlagen! **[ABB. 03 – Behandlungszeitplan]**

Wichtige Empfehlungen zur Optimierung der Wirksamkeit von Mycosan

- Trocknen Sie nach dem Waschen Ihre Hände und Füße systematisch mit einem sauberen Handtuch ab, das nur für Sie bestimmt ist. Achten Sie besonders auf die Zwischenräume von Fingern und Zehen.
- Schneiden Sie Ihre Nägel kurz, beißen Sie nicht auf Ihre Nägel und vermeiden Sie das Reißen der Nagelhaut. Dies schwächt die Nägel und setzt sie Mikrotraumata aus.
- Verwenden Sie bevorzugt Baumwollsocken, um Ihre Füße frisch und trocken zu halten. Wechseln Sie sie regelmäßig bei starkem Schwitzen.
- Vermeiden Sie Schuhe, die aus synthetischen Materialien hergestellt sind.
- Wählen Sie geeignete Schuhe aus, weder zu eng noch zu geschlossen, damit Ihre Füße atmen können.
- Tragen Sie immer Sandalen im Schwimmbad und in Umkleidekabinen, um den Kontakt mit Pilzen, die sich in einem feuchten Umfeld vermehren, zu vermeiden.
- Behandeln Sie systematisch Fußpilz, denn er kann sich auf die Zehnnägel ausbreiten. Für diesen Typ von Pilz wird ebenfalls empfohlen, die Socken und die Schuhe mit einem Antipilzprodukt zu behandeln.

Unerwünschte Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann eine allergische Reaktion auf einen der Bestandteile auftreten (Kontaktdermatitis). Brechen Sie die Behandlung sofort ab, wenn Anzeichen einer Reizung oder eines Ausbruchs auftreten. Fragen Sie Ihren Arzt wenn das Problem andauert.

Warnhinweise für die äußere Anwendung

Bei Kindern unter 4 Jahren nicht anwenden. Mycosan darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile nicht angewendet werden. Verwenden Sie das Produkt möglichst nur für sich selbst.

Besondere Lagerungsbedingungen

Bei Raumtemperatur lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Tubenlabel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Schließen Sie die Tube sorgfältig nach jeder Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mycosan.com

Letzte Überarbeitung: 05/11/2014

Vertrieben durch:

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk

Design Department Harlow

Colours:

Cutter Guide

PMS 2757

PMS Green

PRODUCT:

Mycosan Nail Serum 5ml All (Serrix) TBE

Prod V2

Barcode:

Job No: 37156

SAP No: -

Designer: MW

Date: 25-11-14

Component: Leaflet

Dimensions: 200x245mm

Template Check: Y

Spell Check: -

Fonts: (Artwork)

Arial 5pt body (as pill used)

Software used: Illustrator CS6

100% Scale: 10 mm

Tints used: PMS 2757 10%

Amends:

Draft: 2

Rev date: 11-12-14

Reviser: MW

Artworker's Signature:

Approval:

Artwork Planner

Signed

Date

• Subject to Reg. Agency approval

• Approved by Reg. Dept. for print

Signed

Date

Supplier Instructions

Artwork, text and content must NOT be altered. The only exceptions to this are: bleeds, chokes, spreads or other adjustments required for print reproduction purposes only. If you have any difficulties please contact the Teva Artwork Team. We must receive a copy of the 3rd Party Vendors Proof before final approval can be made.

H37156