100006A

URGO

FR

# CORICIDE

## Protection et Traitement des cors, œils de perdrix et durillons

Pansements adhésifs en sachet

**• Mode d'emploi**

Appliquer le pansement une fois par jour, pendant au maximum 8 jours, après un bain de pied chaud, sur la lésion sans déborder sur la peau saine, de préférence le soir au coucher.

**• Contre-indications**

Le pansement ne doit pas être utilisé :
- en cas d'allergie aux salicylés ou à un autre composant.
- en cas de cors infectés.
- chez les enfants de moins de 16 ans.

**• Précautions d'emploi**

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ce produit est caustique. Ne pas déborder en dehors de la zone à traiter.
- Arrêter l'application en cas de survenue de douleurs.
- En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant utilisation.
- En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récidive, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).
- Comme tout produit actif, ce produit peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants notamment d'irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine, allergie.
- En cas de doute, demander l'avis de votre pharmacien ou médecin.
- En l'absence d'améliorations après 8 jours de traitement, consultez votre pédicure/podologue.
- La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

**• Conservation**

Conserver à une température inférieure à 25°C.

**• Composition**

Acide salicylique : 32 mg - Excipients : cire d'abeille blanche - glycérides polyglycolysés saturés - silice colloïdale hydrophobe - chlorophylle cuivrique.

**• Contenu de la boîte**

12 pansements adhésifs avec acide salicylique en sachets.

NL

# Likdoornmiddel

## Bescherming en Behandeling van Likdoorns, Eksterogen, Eeltknobbels

Hechtpleisters in zakjes

**• Gebruiksaanwijzing**

De pleister één keer per dag op het letsel aanbrengen, gedurende maximaal 8 dagen, na een warm voetbad, bij voorkeur 's avonds voor het slapengaan. Vermijd hierbij de gezonde huid.

**• Contra-indicaties**

De pleisters mogen niet worden gebruikt:
- in geval van allergie voor salicylaten of een ander bestanddeel.
- in geval van ontstoken likdoorns.
- bij kinderen jonger dan 16 jaar.

**• Gebruiksvoorzorgen**

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit product is bijtend. Niet verder dan de te behandelen zone kleven.
- Het gebruik stoppen in geval van pijn.
- In geval van arteritis, diabetes of neuropathie uw arts raadplegen voor gebruik.

| | |
|---|---|
| LABORATOIRES URGO HEALTHCARE | Laboratoires URGO HEALTHCARE<br>SERVICE PAO<br>Bâtiment 20 Belem<br>42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France |
| DÉSIGNATION DE L'ARTICLE : | **IFU CORICIDES BFR**<br>**Recto** |
| CODE ARTICLE : | CODE PF : |
| 100006 VERSION A | 600004 |
| Réf Tracé DECOUPE : | DIMENSIONS : |
| 90-240-00 | 90 x 240 mm<br>Corps 09 |
| IMPRESSION 1 COULEUR : | DATE DE REALISATION : |
| ■ 300 U | 23/10/2019<br>LAC 2 |
| | DATE DE VALIDATION : |
| | 30/10/2019<br>LAC |
| + Découpe | |
| VISA CHEF PRODUIT : | |
| NOM : B. MOTZ<br>DATE : /10/2019 | |

CETTE ÉPREUVE COULEUR EST UTILISÉE UNIQUEMENT POUR LE POSITIONNEMENT DU TEXTE, CODE À BARRES ET ILLUSTRATION.

THIS COLOR PRINT IS ONLY USED FOR THE TEXT, BARCODE AND PICTURE POSITIONNING.

- Raadpleeg uw arts als een correct uitgevoerde behandeling mislukt, of wanneer het probleem terugkomt. Het kan nuttig zijn de oorzaak op te sporen en die dan te behandelen (orthopedische meting om de steun te corrigeren, verandering schoeisel).
- Zoals elk werkzaam product kan dit middel bij sommige mensen min of meer hinderlijke effecten hebben, met name huidirritatie als het wordt aangebracht op een gezonde huid, of allergie.
- Vraag in geval van twijfel advies aan uw apotheker of arts.
- Raadpleeg uw pedicure/podoloog als er na acht dagen behandeling geen verbetering is.
- Een product voor eenmalig gebruik opnieuw gebruiken, kan een infectierisico met zich meebrengen.

**• Bewaring**
Bewaren beneden 25°C.

**• Samenstelling**
Salicylzuur: 32 mg - Hulpstoffen: witte bijenwas - verzadigde polygeglycolyseerde glyceriden - hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide - koperchlorofyl.

**• Inhoud van de doos**
12 hechtpleisters met salicylzuur in zakjes.

DE

# Coricide

## Schutz und Behandlung von Hornhaut, Hühneraugen und Schwielen

Heftpflaster in Einzelbeuteln

**• Gebrauchsanleitung**
Pflaster höchstens 8 Tage lang einmal täglich nach einem warmen Fußbad auf die betroffene Stelle auflegen, ohne gesunde Haut zu bedecken, bevorzugt abends beim Schlafengehen.

**• Gegenanzeigen**
Das Pflaster darf nicht benutzt werden:
- im Falle von allergischen Reaktionen mit Salicylsäure oder einem anderen Bestandteil.
- im Falle von entzündeter Hornhaut.
- bei Kindern unter 16 Jahren.

**• Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Produkt ist ätzend. Nicht über die zu behandelnde Hautstelle hinaus gehen.
- Im Falle von Schmerzen die Anwendung unterbrechen.
- Konsultieren Sie im Falle von Arteritis, Diabetes oder Neuropathie Ihren Arzt vor der Benutzung.
- Konsultieren Sie, falls die Behandlung bei richtiger Anwendung erfolglos bleibt, oder im Falle eines Rückfalls Ihren Arzt. Es kann sich als nützlich erweisen, die Ursache herauszufinden und sie entsprechend zu behandeln (orthopädische stützende Korrekturmaßnahme der Abstützung, Abänderung der Fußbekleidung).
- Wie alle aktiven Produkte kann dieses Produkt bei bestimmten Personen mehr oder weniger störende Auswirkungen haben, insbesondere Reizung der Haut im Falle einer Anwendung auf der gesunden Haut, Allergie.
- Fragen Sie im Zweifelsfalle Ihren Apotheker oder Arzt um Rat.
- Sollte nach 8 Tagen Behandlung keine Besserung eintreten, wenden Sie sich an Ihre Fußpfleger(in)/Podologen(in).
- Die Wiederverwendung eines Einwegprodukts kann Infektionsrisiken mit sich bringen.

**• Aufbewahrung**
Nicht über 25°C lagern.

**• Zusammensetzung**
Salicylsäure: 32 mg - Hilfsstoffe: weißes Bienenwachs – mehrfach glykosylierte Glyceride - kolloidales hydrophobes Sliziumdioxid - Kupferchlorophyll.

**• Inhalt der Box**
12 Heftpflaster mit Salicylsäure in Einzelbeuteln.

Date of issue CE marking: 2009
Latest revision of the leaftlet: 10-2019

CE 0459

**Distributeur/Händler/Verdeler:**
Urgo SA/NV - Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Brussels

**Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France**

| | |
|---|---|
| LABORATOIRES URGO HEALTHCARE | Laboratoires URGO HEALTHCARE<br>SERVICE PAO<br>Bâtiment 20 Belem<br>42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France |
| *DÉSIGNATION DE L'ARTICLE :* | **IFU CORICIDES BFR Verso** |
| *CODE ARTICLE :* / *VERSION* | ***100006*** **A** |
| *CODE PF :* | ***600004*** |
| *Réf Tracé DECOUPE :* | 90-240-00 |
| *DIMENSIONS :* | 90 x 240 mm<br>Corps 09 |
| *IMPRESSION* ***1*** *COULEUR :* | ■ 300 U<br>+ Découpe |
| *DATE DE REALISATION :* | 23/10/2019<br>**LAC 2** |
| *DATE DE VALIDATION :* | 30/10/2019<br>**LAC** |
| *VISA CHEF PRODUIT :* | *NOM :* B. MOTZ<br>*DATE :* /10/2019 |

CETTE ÉPREUVE COULEUR EST UTILISÉE UNIQUEMENT POUR LE POSITIONNEMENT DU TEXTE, CODE À BARRES ET ILLUSTRATION.
THIS COLOR PRINT IS ONLY USED FOR THE TEXT, BARCODE AND PICTURE POSITIONNING.