# eXCILOR® BEHANDELING VAN WRATTEN FREEZE

**Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing.**

## Hoe gebruikt u Excilor® FREEZE?

### Vóór de behandeling

**Voor het beste resultaat bij voetwratten.**
Door likdoorns en eelt (harde huid) wordt het bevriezen van wratten lastiger.



Doe het volgende voor het beste resultaat bij voetwratten:
- Laat de voet 10 minuten weken in lauw water. Maak de voet voor de behandeling goed droog.
- Verwijder harde huid voorzichtig met een puimsteen of voetvijl.

### Na gebruik van Excilor® FREEZE

- Het gebruik van de **Excilor® FREEZE-pen** geeft een tintelend gevoel en de huid kan pijnlijk of geïrriteerd aanvoelen. U hoeft zich geen zorgen te maken. Deze effecten zouden na een paar uur moeten verdwijnen.
- Op de plaats waar u **Excilor® FREEZE** heeft gebruikt, wordt de huid wit. Na een tijd krijgt de huid weer zijn normale kleur en ziet de wrat er rood uit.
- Binnen enkele minuten tot enkele dagen na het bevriezen kan er een blaar ontstaan, soms gevuld met bloed. Dit is een normaal gevolg van het bevriezingsproces en geeft meestal aan dat de behandeling is gelukt. Probeer de blaar niet open te prikken. Bescherm de blaar indien nodig met een steriel verband of desinfecteer de blaar als deze is opengegaan.
- Als u of uw kind een wrat op de voetzool heeft die pijnlijk is bij het lopen, breng dan een ronde likdoompleister aan. Dit biedt meer comfort.
- Raak de behandelde plek niet aan en probeer de wrat ook niet eraf te trekken.
- Houd de behandelde plek schoon en desinfecteer indien nodig. Dit is belangrijk om superinfectie van de behandelde huid te voorkomen.
- U mag baden en douchen.

### Moet ik de behandeling herhalen?

- **Excilor® FREEZE** is zeer effectief. Al na een paar seconden wordt de kern van de wrat bereikt en vernietigd. Door de natuurlijke vervelling van de huid komt de wrat los. Meestal verdwijnt de wrat al na één behandeling. Voor oude of grote wratten is mogelijk meer dan één behandeling nodig, vooral als ze op de voet zitten.
- Als de wrat, of een deel ervan, na 14 dagen nog niet is verdwenen, herhaal dan de behandeling (stap 1, 2 en 3).
- Als u op uw vinger, voet of teen wratten dicht bij elkaar heeft, behandel de wratten dan één voor één. Wacht 14 dagen voordat u de volgende wrat behandelt.
- Raadpleeg uw arts als een wrat na 3 behandelingen nog niet is verdwenen. Vergeet niet om tussen twee behandelingen minstens 14 dagen te wachten.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Wat is Excilor® FREEZE?

**Excilor® FREEZE** is een revolutionaire methode om hand- en voetwratten thuis te behandelen. Het is de eerste wrattenbehandeling voor thuisgebruik die gebruikmaakt van distikstofoxide, een zeer koud gas. Dit gas bevriest wratten bij -80 °C en dringt door tot in de kern van de wrat. **Excilor® FREEZE** is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar. **Excilor® FREEZE** is snel en eenvoudig te gebruiken en veilig als de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd.

### Wat als de Excilor® FREEZE-pen leeg is of niet werkt?

- Als de punt van de pen niet is bevroren of als u geen ijsdamp ziet nadat u de pen heeft geactiveerd en geladen (activeren en stap 1), is de pen leeg. Gebruik een nieuwe pen.
- Als u een aanhoudend sissend geluid hoort nadat u de **Excilor® FREEZE-pen** heeft geactiveerd en al het gas eruit stroomt, is de pen defect. Probeer de pen niet te openen of zelf te repareren. Ook niet als u denkt dat deze leeg is. Breng de pen terug naar uw apotheek.

⚠

## VOORZORGSMAATREGELEN

- **Gebruik de pen niet langer dan 15 seconden op dunne huid (handen, vingers, tenen, boven-/zijkant voeten ...) en 40 seconden op dikke, eeltige huid (voetzolen). Verkeerd of langdurig gebruik kan de huid of zenuwen beschadigen.**
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bevat kleine onderdelen.
- De **Excilor® FREEZE-pen** moet door een volwassene worden gebruikt om wratten bij kinderen te behandelen.
- Adem geen distikstofoxide in- dit kan leiden tot symptomen zoals duizeligheid, verwarring en hoofdpijn.
- Distikstofoxide is een niet-giftig, niet-ontvlambaar gas, maar zal bij brand wel ontbranden. Uit de buurt van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken houden. Niet roken of gebruiken in de buurt van open vuur.
- **Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.** De pen staat onder hoge druk en mag niet worden geopend.

## ONGEWENSTE BIJWERKINGEN

- Blaren rond de behandelde plek (mogelijk bloedblaren). Deze zullen variëren van geval tot geval (zie het gedeelte 'Na het gebruik van **Excilor® FREEZE**').
- Kleurverlies van de huid – ook bekend als 'depigmentatie'.
- Bevriezingswondjes en littekenvorming.
- Risico op huid-/zenuwletsel (bij overmatige blootstelling).
- Tijdelijk een vreemd gevoel (tintelingen, prikkelingen).

## Raadpleeg uw arts:

- Als u of uw kind onverwachte bijwerkingen krijgt.
- Als de wrat niet geneest.
- Als de wrat na 3 behandelingen niet is verdwenen.
- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Meld vermoedelijke incidenten en klachten met betrekking tot dit product aan de fabrikant via **www.excilor.com**. Dit is belangrijk voor de voortdurende bewaking van de risico-batenverhouding van het product. Meld vermoedelijke ernstige incidenten met dit product bovendien aan de fabrikant via **www.excilor.com** en aan uw nationale bevoegde autoriteit.

## CONTRA-INDICATIES

**Excilor® FREEZE** mag niet worden gebruikt:
- Bij kinderen jonger dan 4 jaar.
- Bij clusters van wratten of wratten die dicht bij elkaar liggen (min. 3 cm). Behandel één wrat en wacht 14 dagen voordat u de volgende behandelt, omdat dit anders tot overmatige beschadiging van de huid kan leiden.
- Op het gezicht, in de lies, op genitaliën, op de hoofdhuid of op slijmvlies.
- Bij personen met diabetes of problemen met de bloedsomloop of bloedstolling.
- Bij wratten op gevoelige huid. Wees extra voorzichtig bij plekken waar de huid dunner is (bijv. rond gewrichten).
- Als de wrat en/of de huid rondom bloedt of open, geïrriteerd, jeukerig, ontstoken of rood is.
- Op gezonde huid (zonder wratten).
- Op waterwratten ('molluscum contagiosum') of andere soorten blaasjes of blaren.
- Als u niet zeker weet of het gezwel een gewone wrat is. Verwijder geen vlekken, moedervlekken, recente gevasculariseerde en onregelmatige gezwellen of iets anders dat huidkanker (melanoom) zou kunnen zijn.

## SAMENSTELLING

Distikstofoxide.

## BEWARING

### Vóór het eerste gebruik:



- Droog en koel bewaren (5 - 25 °C). Beschermen tegen zonlicht.
- Niet in de vriezer bewaren.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet bewaren in auto's, caravans of andere plaatsen die warm kunnen worden. Door een stijgende temperatuur wordt de pen beschadigd en permanent uitgeschakeld.
- Beschermen tegen zonlicht. Uit de buurt van vuur en hitte houden.

### Na elk gebruik:

- Wacht twee minuten na gebruik, gooi de wegwerppunt weg en plaats een nieuwe punt. De pen is nu klaar voor later gebruik.
- Plaats de dop terug en bewaar de pen in de koelkast. Hierdoor gaat de pen langer mee en neemt het aantal bruikbare doses toe. Niet in de vriezer bewaren.
- Stel het geactiveerde middel niet bloot aan temperaturen boven 35 °C om te voorkomen dat een veiligheidsfunctie wordt geactiveerd en de pen definitief onbruikbaar wordt.
- Gebruik alleen een vochtige doek om de plastic onderdelen van de pen schoon te maken.

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

De verpakking bevat 1 **Excilor® FREEZE-pen**, met 1 $N_2O$-patroon en een set van 4 wegwerppunten.

Houdbaarheid in de koelkast na het eerste gebruik: 2 maanden.

Gebruik het product niet na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst bijgewerkt in: **juli 2024.**

MD

---

**ALLEEN VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK**

### ACTIVEREN

**Verwijder de dop nog niet.**



Draai het witte deel **een keer helemaal rond** in de richting van de pijl, totdat u een **luide** klik hoort. Hier is enige kracht voor nodig.




**De pen is nu klaar. Nadat u het apparaat hebt geactiveerd, mag u deze stap nooit meer herhalen.**

**VOLG DEZE STAPPEN ELKE KEER DAT U DE WRAT BEHANDELT**

### 1 LADEN

Voor elke behandeling moet u de pen met koud gas laden.

Houd de pen met één hand stabiel, met de transparante dop naar beneden, zodat de pen niet van tafel glijdt.




Met de andere hand: **druk de Excilor® FREEZE-pen precies 2 seconden stevig in**:
- Gebruik voldoende kracht en tel langzaam hardop: 'een ... twee ...'.
- U voelt mogelijk wat weerstand. Blijf stevig drukken.

### 2 CONTROLEREN

VERWIJDER DE DOP.
U moet nu ijsdamp zien.
**Gebruik de pen onmiddellijk.**

Herhaal stap 1 als u geen ijsdamp ziet.



### 3 BEHANDELEN

Druk de punt van de pen **stevig** tegen de wrat:

- **15 seconden op dunne huid (handen, vingers, tenen, boven-/zijkant van voeten)**

**of**

- **40 seconden op dikke, eeltige huid (voetzolen).**

Gebruik een klok of tel langzaam hardop:
«een ... twee ... drie ...» enzovoort.




### NA DE BEHANDELING



Wacht twee minuten na gebruik, gooi de wegwerppunt na elk gebruik weg en plaats een nieuwe punt. De pen is nu klaar voor later gebruik.
**Plaats de dop terug en bewaar de pen in de koelkast.**

---

# eXCILOR® TRAITEMENT DES VERRUES FREEZE

**Avant utilisation, lire attentivement la notice.**

## Utilisation d'Excilor® FREEZE

### Avant le traitement

**Pour un résultat optimal sur les verrues plantaires.**
Les cors et les callosités (peau dure) compliquent la cryothérapie. Pour un résultat optimal sur les verrues plantaires :



- Trempez le pied dans de l'eau tiède pendant 10 minutes. Séchez bien le pied avant le traitement.
- Éliminez délicatement les peaux dures à l'aide d'une pierre ponce ou d'une lime pour pieds.

### Après l'utilisation d'Excilor® FREEZE

- L'utilisation du stylo **Excilor® FREEZE** provoque une sensation de picotement et la peau peut être douloureuse ou irritée. Ne vous inquiétez pas. Ces effets devraient disparaître après quelques heures.
- La peau blanchit aux endroits où vous avez utilisé **Excilor® FREEZE**. Elle reprend sa couleur normale après quelque temps tandis que la verrue rougit.
- De quelques minutes à plusieurs jours après la cryothérapie, une ampoule peut apparaître, parfois remplie de sang. Il s'agit d'une conséquence normale du processus de cryothérapie, qui indique généralement que le traitement a réussi. Ne tentez pas de percer l'ampoule. Si nécessaire, protégez-la à l'aide d'un pansement stérile ou si elle s'est ouverte, désinfectez-la correctement.
- Si votre enfant ou vous-même avez une verrue sur la plante du pied qui vous fait mal quand vous marchez, appliquez un anneau pour cors sur la zone pour vous soulager.
- Ne grattez pas la zone traitée et ne tentez pas d'arracher la verrue.
- Maintenez la zone traitée propre et désinfectez-la si nécessaire afin d'éviter toute suinfection de la peau traitée.
- Les bains et les douches sont autorisés.

### Faut-il répéter le traitement ?

- **Excilor® FREEZE** est très efficace. Après seulement quelques secondes d'utilisation, la base de la verrue est atteinte et détruite. La verrue disparaît alors avec la desquamation naturelle de la peau. Dans la plupart des cas, la verrue disparaît après un seul traitement. Les verrues anciennes ou de grande taille peuvent nécessiter plus d'un traitement, surtout si elles siègent sur le pied.
- Si la verrue ou une partie de celle-ci ne disparaît pas après 14 jours, il convient de répéter le traitement (étapes 1, 2 et 3).
- Si les verrues sont proches les unes des autres sur un doigt, un pied ou un orteil, il y a lieu de traiter chaque verrue séparément. Attendez 14 jours avant de traiter la verrue suivante.
- Si une verrue ne disparaît pas après 3 traitements, parlez-en à votre médecin. N'oubliez pas de laisser un délai minimal de 14 jours entre chaque traitement.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Qu'est-ce qu'Excilor® FREEZE ?

**Excilor® FREEZE** est un traitement à domicile révolutionnaire pour les verrues siégeant sur les mains et les pieds. Il s'agit du premier traitement des verrues à domicile à base de protoxyde d'azote, un gaz très froid. Il gèle les verrues à -80 degrés Celsius et atteint le coeur de la verrue. **Excilor® FREEZE** peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant de plus de 4 ans. **Excilor® FREEZE** est rapide, facile à utiliser et sûr s'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

### Que faire si le stylo Excilor® FREEZE est vide ou cassé ?

- Si vous ne voyez pas de givre ou de vapeur de glace après avoir activé et chargé le stylo (activation et étape 1), le stylo ne contient plus de gaz. Utilisez dès lors un nouveau stylo.
- Si vous entendez un sifflement continu après avoir activé le stylo **Excilor® FREEZE** et si tout le gaz s'échappe, le stylo est cassé. Ne tentez pas d'ouvrir le stylo ou de le réparer vous-même, même si vous pensez qu'il est vide. Rapportez le stylo chez votre pharmacien(ne).

⚠

## MESURES DE PRÉCAUTION

- **Ne pas appliquer plus de 15 secondes sur peau fine (mains, doigts, orteils, flanc/dessus du pied...) et 40 secondes sur peau épaisse et calleuse (plante du pied). Une utilisation inappropriée ou prolongée peut endommager la peau ou les nerfs.**
- Destiné uniquement à un usage externe.
- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Contient de petits éléments.
- Le stylo **Excilor® FREEZE** doit être utilisé par un adulte pour traiter une verrue chez l'enfant.
- Ne pas inhaler le protoxyde d'azote. Les symptômes peuvent inclure des vertiges, de la confusion et des maux de tête.
- Le protoxyde d'azote est un gaz non toxique et ininflammable, mais il favorise la combustion en cas d'incendie. Tenir à l'écart de toute source de chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer et ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.
- **Récipient sous pression. Peut éclater si chauffé. Ne pas percer ni brûler même après utilisation.** Le stylo est sous haute pression et ne peut être ouvert.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Ampoules autour de la zone traitée (éventuellement remplies de sang). Elles varient d'un cas à l'autre (voir la rubrique « Après l'utilisation d'**Excilor® FREEZE** »).
- Perte de couleur de la peau ou « dépigmentation »
- Brûlures mineures et formation de cicatrices
- Risque de lésions de la peau/des nerfs (en cas de surexposition)
- Sensation provisoirement perturbée (picotements, fourmillements).

## Consultez votre médecin :

- Si votre enfant ou vous-même présentez un effet indésirable inattendu.
- Si la verrue ne guérit pas.
- Si la verrue n'a pas disparu après 3 traitements.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Veuillez signaler au fabricant tout incident suspecté et toute plainte concernant ce produit à l'adresse suivante **www.excilor.com.** C'est particulièrement important pour le suivi continu du rapport bénéfice/risque du produit. Veuillez signaler au fabricant tout incident grave suspecté concernant ce produit à l'adresse suivante **www.excilor.com** et à votre autorité nationale compétente.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser **Excilor® FREEZE** :
- Chez l'enfant de moins de 4 ans.
- Sur les verrues en grappe ou très proches les unes des autres (min. 3 cm). Traitez une seule verrue, puis attendez 14 jours avant de traiter la suivante. Dans le cas contraire, la peau pourrait s'en voir endommagée de façon excessive.
- Sur le visage, l'aine, les organes génitaux, le cuir chevelu ou les muqueuses.
- Chez une personne diabétique ou souffrant de problèmes de circulation ou de coagulation sanguine.
- Sur les verrues siégeant sur une peau sensible. De plus, il convient d'accorder une attention particulière en cas de traitement sur peau fine (par ex. autour des articulations).
- Si la verrue et/ou la peau environnante saigne, démange ou est ouverte, irritée, infectée ou rouge.
- Sur une peau saine (peau sans verrues).
- Sur des vésicules siégeant sur la peau, remplies de liquide (appelées « molluscum contagiosum ») ou sur toute autre vésicule ou ampoule.
- Si vous doutez qu'il s'agisse d'une verrue commune. Ne tentez pas d'enlever des taches de naissance, des grains de beauté, des excroissances récentes vascularisées et irrégulières, ou tout ce qui pourrait être un cancer de la peau (mélanome).

## COMPOSITION

Protoxyde d'azote.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

### Avant la première utilisation :



- Conserver dans un endroit sec et frais (5-25 °C). Protéger de la lumière du soleil.
- Ne pas conserver au congélateur.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Ne pas conserver le produit dans une voiture, une caravane ou tout autre endroit susceptible de chauffer. Une augmentation de la température endommagera le stylo et le rendra définitivement inutilisable.
- Protéger de la lumière du soleil. Tenir à l'écart du feu et de toute source de chaleur.

### Après chaque utilisation :

- Attendre deux minutes après utilisation. Jeter l'embout jetable et en insérer un nouveau. Le stylo est maintenant prêt pour la prochaine utilisation.
- Remettre le capuchon et conserver le stylo au réfrigérateur pour en prolonger la durée de vie et augmenter le nombre de doses utiles. Ne pas conserver au congélateur.
- Ne pas exposer le dispositif activé à des températures supérieures à 35 °C. Cela activerait un dispositif de sécurité qui désactiverait le stylo de façon définitive.
- Pour nettoyer les parties en plastique du stylo, utiliser uniquement un chiffon humide.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

La boîte comprend 1 stylo **Excilor® FREEZE** avec 1 cartouche de $N_2O$ et un jeu de 4 embouts jetables.

Durée de conservation au réfrigérateur après la première utilisation : 2 mois.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

La présente notice a été mise à jour pour la dernière fois en : **Juillet 2024.**

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION SEULEMENT

### ACTIVER

**Ne retirez pas encore le capuchon.**



Tournez la partie blanche sur **un tour complet** dans le sens de la flèche jusqu'à un clic **sonore**. Il y a lieu d'exercer une certaine force.




**Le stylo est maintenant prêt à l'emploi. Une fois l'activation du dispositif réussie, ne répétez jamais cette étape.**

## SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES À CHAQUE FOIS QUE VOUS TRAITEZ UNE VERRUE

### 1 CHARGER

Avant chaque traitement, le stylo doit être chargé en gaz froid. Tenez le stylo d'une main, le capuchon transparent tourné vers le bas de sorte qu'il ne glisse pas de la table.




De l'autre main, **appuyez fermement sur le stylo Excilor® FREEZE pendant exactement 2 secondes** :
• Exercez une forte pression et comptez lentement à haute voix : « un … deux … ».
• Il se peut que vous sentiez une certaine résistance. Continuez à pousser en exerçant une forte pression.

### 2 VÉRIFIER

RETIRER LE CAPUCHON.
Vous devriez voir de la vapeur de glace se dégager.
**Utilisez alors immédiatement le stylo.**

S'il n'y a pas de vapeur de glace, répétez l'étape 1.



### 3 TRAITER

Appuyez **fermement** la pointe du stylo sur la verrue :

• **15 secondes sur peau fine (mains, doigts, orteils, dessus/flanc du pied)**
**ou**
• **40 secondes sur peau épaisse et calleuse (plante du pied).**
Utilisez une montre ou comptez lentement à haute voix « un … deux … trois … », etc.






### TRAITEMENT TERMINÉ

Attendez deux minutes après utilisation. Jetez l'embout jetable après chaque utilisation et insérez-en un nouveau. Le stylo est maintenant prêt pour une prochaine utilisation.
**Remettez le capuchon et conservez le stylo au réfrigérateur.**

---

# eXCILOR® WARZEN-BEHANDLUNG FREEZE

**Lesen Sie die Packungsbeilage vor der Behandlung sorgfältig durch.**

## Vorgehensweise zur Anwendung von Excilor® FREEZE

### Vor der Behandlung

**Für beste Ergebnisse bei Fußwarzen.**



Hühneraugen und Hornhaut (verhärtete Haut) erscheinen das Vereisen. Für optimale Ergebnisse bei Fußwarzen:
• Weichen Sie den Fuß 10 Minuten in lauwarmem Wasser ein. Vor der Behandlung gründlich abtrocknen.
• Entfernen Sie Hornhaut vorsichtig mit einem Bimsstein oder einer Fußfeile.

### Nach der Anwendung von Excilor® FREEZE

• Die Anwendung des **Excilor® FREEZE** Pens verursacht ein Kribbeln, und die Haut kann sich wund oder gereizt anfühlen. Diese Nachwirkungen sind normal und sollten nach ein paar Stunden verschwinden.
• An der Stelle, an der Sie **Excilor® FREEZE** verwendet haben, wird die Haus weiß sein. Nach kurzer Zeit nimmt die Haut wieder ihre normale Farbe an und die Warze sieht gerötet aus.
• Innerhalb weniger Minuten bis mehrere Tage nach dem Vereisen kann sich eine Blase bilden, die mitunter mit Blut gefüllt ist. Dies ist eine normale Folge der Vereisung und bedeutet in der Regel, dass die Behandlung erfolgreich war. Versuchen Sie nicht, die Blase aufzustechen. Bringen Sie gegebenenfalls zum Schutz ein steriles Pflaster an oder desinfizieren Sie die Blase gründlich, falls sie sich geöffnet hat.
• Wenn Sie oder Ihr Kind eine Warze an der Fußsohle haben, die beim Gehen Schmerzen verursacht, kleben Sie ein rundes Hühneraugenpflaster auf die Stelle, um die Beschwerden zu verringern.
• Zupfen Sie nicht an der behandelten Stelle und versuchen Sie nicht, die Warze abzureißen.
• Halten Sie die behandelte Stelle sauber und desinfizieren Sie sie, falls erforderlich. Das ist wichtig, um eine Zweitinfektion der behandelten Haut zu vermeiden.
• Baden und Duschen sind erlaubt.

### Muss ich die Behandlung wiederholen?

• **Excilor® FREEZE** ist sehr effektiv – bereits nach wenigen Sekunden wird die Basis der Warze erreicht und zerstört. Die Warze löst sich schließlich durch die natürliche Abschuppung der Haut, in den meisten Fällen bereits nach einer Behandlung. Bei länger vorhandenen oder großen Warzen können mehrere Behandlungen erforderlich sein, insbesondere wenn sich diese am Fuß befinden.
• Wenn die Warze oder ein Teil davon nach 14 Tagen nicht verschwunden ist, wiederholen Sie die Behandlung (Schritt 1, 2 und 3).
• Bei Warzen an einem Finger, Fuß oder Zeh, die eng beieinander liegen, müssen Sie jede Warze einzeln behandeln – warten Sie 14 Tage, bevor Sie die nächste Warze behandeln.
• Wenn eine Warze nach 3 Behandlungen nicht verschwindet, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt. Denken Sie daran, zwischen den Behandlungen mindestens 14 Tage zu warten.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Was ist Excilor® FREEZE ?

**Excilor® FREEZE** ist eine innovative Behandlung von Hand- und Fußwarzen und die erste Warzenbehandlung zur Selbstanwendung mit Distickstoffmonoxid, einem sehr kalten Gas, für zu Hause. Es vereist Warzen bei -80 Grad Celsius und erreicht den Kern der Warze. **Excilor® FREEZE** kann bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren angewendet werden. **Excilor® FREEZE** ist schnell, sicher und einfach anzuwenden wenn nach der Gebrauchsanleitung angewandt.

### Was tun, wenn Ihr Excilor® FREEZE Pen leer oder defekt ist?

• Wenn Sie nach dem Aktivieren und Beladen des Pens (Aktivierung und Schritt 1) keinen Frostbeschlag oder Eisdampf sehen, ist das Gas im Pen aufgebraucht – verwenden Sie einen neuen Pen.
• Wenn Sie ein anhaltendes Zischen hören, nachdem Sie den **Excilor® FREEZE** Pen aktiviert haben, und das ganze Gas ausströmt, ist der Pen defekt. Versuchen Sie nicht, den Pen selbst zu öffnen oder zu reparieren – auch nicht, wenn Sie denken, dass er leer ist. Geben Sie den Pen in Ihrer Apotheke zurück.

## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

• **Nicht länger als 15 Sekunden auf dünner Haut (Hände, Finger, Zehen, Fußrücken/Seite der Füße...) und 40 Sekunden auf dicker Hornhaut (Fußsohlen) anwenden. Eine falsche oder zu lange Anwendung kann die Haut oder die Nerven schädigen.**
• Nur zur äußerlichen Anwendung.
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält Kleinteile.
• Die Behandlung von Warzen bei Kindern mit dem **Excilor® FREEZE** Pen sollte von einer erwachsenen Person durchgeführt werden.
• Distickstoffmonoxid nicht einatmen – Symptome können Schwindelgefühl, Verwirrtheit und Kopfschmerzen sein.
• Distickstoffmonoxid ist ein ungiftiges, nicht brennbares, jedoch brandförderndes Gas. Von Hitzequellen/ Funkenflug/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen oder in der Nähe von offenen Flammen verwenden.
• **Behälter steht unter Druck. Kann bei Erhitzung explodieren.** Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen – der Pen steht unter hohem Druck und darf nicht geöffnet werden.

## UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

• Blasenbildung an der behandelten Stelle (mögliche Blutblasen) – diese sind von Fall zu Fall unterschiedlich (siehe Abschnitt „Nach der Anwendung von **Excilor® FREEZE**").
• Die Haut verliert ihre Farbe – sogenannte „Depigmentierung".
• Leichte Erfrierungen und Narbenbildung
• Risiko von Haut-/Nervenschäden (bei zu langer Anwendung).
• Vorübergehende Missempfindungen (Kribbeln, Stechen).

## Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt:

• Wenn bei Ihnen bzw. Ihrem Kind unerwartete Nebenwirkungen auftreten.
• Wenn die Warze nicht abheilt.
• Wenn die Warze nach 3 Behandlungen nicht verschwunden ist.
• Wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Bitte melden Sie vermutete Vorfälle und Beanstandungen hinsichtlich dieses Produktes dem Hersteller über **www.excilor.com**, da dies für die kontinuierliche Überwachung des Nutzen/Risiko-Verhältnisses des Produkts wichtig ist. Bitte melden Sie außerdem vermutete schwerwiegende Vorfälle mit diesem Produkt dem Hersteller über **www.excilor.com** und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

## KONTRAINDIKATIONEN

Wenden Sie **Excilor® FREEZE** nicht an:
• Bei Kindern im Alter von unter 4 Jahren.
• Bei einer Gruppe von Warzen oder Warzen, die weniger als 3 cm Abstand zueinander haben. Behandeln Sie eine Warze und warten Sie 14 Tage, bevor Sie die nächste Warze behandeln, da es andernfalls zu übermäßigen Hautschäden kommen könnte.
• Im Gesicht, in der Leistengegend, an den Genitalien, auf der Kopfhaut oder an Schleimhäuten.
• Bei Diabetikern oder Personen mit Durchblutungs- oder Blutgerinnungsstörungen.
• Bei Warzen auf empfindlicher Haut; bei der Behandlung von Stellen, an denen die Haut besonders dünn ist (z. B. an Gelenken) ist besondere Vorsicht erforderlich.
• Wenn die Warze und/oder die umgebende Haut blutet oder offen, gereizt, juckend, infiziert oder gerötet ist.
• Auf gesunder Haut (Haut ohne Warzen).
• Auf flüssigkeitsgefüllten Bläschen auf der Haut (sogenannten Dellwarzen bzw. „Molluscum contagiosum") oder anderen Bläschen oder Blasen.
• Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei dem Hautgebilde um eine gewöhnliche Warze handelt. Versuchen Sie nicht, Muttermale, Leberflecke, frische vaskularisierte und unregelmäßige Hautgebilde oder eine möglicherweise krebsartige Veränderung (Melanom) zu entfernen.

## ZUSAMMENSETZUNG

Distickstoffmonoxid.

## Aufbewahrungsbedingungen

### Vor der ersten Anwendung:

• Trocken und kühl Ort (5–25 °C) lagern. Vor Sonnenlicht schützen.
• Nicht im Tiefkühler aufbewahren.
• Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Nicht in Fahrzeugen, Wohnwagen oder an anderen Orten aufbewahren, die sich aufheizen. Ein Temperaturanstieg beschädigt den Pen und macht ihn dauerhaft unbrauchbar.



• Vor Sonnenlicht schützen. Von offenen Flammen und Hitzequellen fernhalten.

### Nach jeder Verwendung:

• Nach der Verwendung zwei Minuten warten, die Einweg-Spitze entsorgen und eine neue Spitze aufsetzen. Der Pen ist nun für die nächste Anwendung bereit.
• Die Kappe aufsetzen und im Kühlschrank aufbewahren – dies verlängert die Lebensdauer des Pens und erhöht die Anzahl der verwendbaren Dosen. Nicht im Tiefkühler aufbewahren.
• Den aktivierten Pen keinen Temperaturen über 35 °C aussetzen, da dies eine Sicherheitsfunktion aktiviert, die den Pen dauerhaft unbrauchbar macht.
• Wenn Sie die Kunststoffteile des Pens reinigen möchten, verwenden Sie dazu lediglich ein feuchtes Tuch.

## INHALT DER PACKUNG

Jede Packung enthält 1 **Excilor® FREEZE** Pen, 1 $N_2O$-Kartusche und ein Set mit 4 Einweg-Spitzen.

Haltbarkeit im Kühlschrank nach der ersten Anwendung: 2 Monate.

Das Produkt nicht über das auf der Verpackung angegebene Ablaufdatum hinaus verwenden.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt aktualisiert im: **Juli 2024.**

---

## NUR VOR DER ALLERERSTEN ANWENDUNG

### AKTIVIEREN

**Die Kappe noch nicht abnehmen.**



Den weißen Teil in **einer vollen Umdrehung** in Richtung des Pfeils drehen, bis Sie ein **lautes** Klicken hören. Dafür müssen Sie etwas Kraft aufwenden.




**Der Pen ist nun bereit zur Anwendung. Nach erfolgreicher Aktivierung des Pens muss dieser Schritt nicht mehr wiederholt werden.**

## DIE FOLGENDEN SCHRITTE MÜSSEN BEI JEDER WARZENBEHANDLUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN

### 1 BELADEN

Vor jeder Behandlung muss der Pen mit Kältegas befüllt werden.

Stellen Sie den **Excilor® FREEZE** Pen mit der transparente Kappe nach unten auf eine flache und stabile Fläche.




Halten Sie den Pen mit einer Hand gut fest, während Sie **mit der anderen Hand den Pen genau 2 Sekunden lang fest nach unten drücken.**
• Drücken Sie fest und zählen Sie langsam laut: „eins … zwei …".
• Eventuell spüren Sie einen leichten Widerstand. Drücken Sie den Pen weiter fest nach unten.

### 2 PRÜFEN

KAPPE ABNEHMEN.
Sie sollten nun Eisdampf sehen.
**Verwenden Sie den Pen sofort.**
Wenn kein Eisdampf austritt, wiederholen Sie Schritt 1.



### 3 BEHANDELN

Drücken Sie die Spitze des Pens **fest** auf die Warze:
• **15 Sekunden auf dünner Haut (Hände, Finger, Zehen, Fußrücken/ Seite der Füße)**
**oder**
• **40 Sekunden auf dicker Hornhaut (Fußsohlen).**
Sehen Sie auf eine Uhr oder zählen Sie laut und langsam „eins … zwei … drei …" usw.






### BEHANDLUNG ABGESCHLOSSEN

Warten Sie nach der Anwendung zwei Minuten, entsorgen Sie die Einwegspitze nach jedem Gebrauch und setzen Sie eine neue Spitze auf. Der Pen ist nun für die nächste Anwendung bereit.
**Setzen Sie die Kappe wieder auf und lagern Sie den Pen im Kühlschrank.**

---

**Oystershell NV**
**Nijverheidsweg 10**
**9820 Merelbeke – Melle**
**BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN**

CE 0459

1627/620352/24G/07020892/0

**VERKLARING VAN DE RESPECTIEVE SYMBOLEN**
**EXPLICATION DES SYMBOLES RESPECTIFS**
**ERKLÄRUNG DER JEWEILIGEN SYMBOLE**

| | | |
|---|---|---|
| Temperatuurgrens<br>Limite de température<br>Temperaturgrenze | Medisch hulpmiddel<br>Dispositif médical<br>Medizinprodukt | Batchcode<br>Code de lot<br>Chargen-Code |
| Waarschuwing<br>Attention<br>Achtung | Fabrikant<br>Fabricant<br>Hersteller | Uit de buurt van hitte en direct zonlicht houden.<br>Tenir à l'écart de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.<br>Vor Hitze und direktem Sonnenlicht schützen. |
| Distributeur<br>Distributeur<br>Händler | Vervaldatum<br>Date d'expiration<br>Ablaufdatum | Gebruiksaanwijzing<br>Mode d'emploi<br>Gebrauchsanleitung |